

Surgery Center of Pinehurst
Instrucciones para despues de la operacion de chalazietomia (orzuelo) para
pacientes del Dr. Bartiss son los siguientes:

1. Algun flujo o estera en las mañanas cuando se despierta y algunas veces durante el dia. Esto puede ser quitado del parpado usando una toallita con agua tibia.
2. Una bolsita de hielo va ayudar con el malestar para las primeras 24 horas para los adultos y los niños.
3. Para poner los gotitas de los ojos en niños (adultos tambien pueden usar este metodo):
 - *Calienta las gotitas colocandolos en su bolsa del pantaloon por 5-10 minutos antes de meterle las goats en el ojo(s).
 - *Deje que su niño se acueste en su espalda y que mantenga sus ojos cerrados.
 - *Con los ojos cerrados, ponga una gotita en la esquina del ojo donde los parpado se juntan.
 - *Gentilmente jale el parpado de arriba y deje que la gotita entren a los ojos.
 - *Haz que su niño se acueste con los ojos cerrados por un minuto completo para Que el ojo lo absorbe, limpie el exceso
4. Niños y adultos en general hacen bien con ibuprofen en dosis apropiado para su edad y peso notado en el frasco. Esto puede ser dado cada cuatro horas como sea necesario para el malestar.
5. El paciente puede resumir todas las actividades normales cuando se sienta mejor. Actividades normales como regresando a la escuela, trabajo y/o jugando afuera es permitido. En muchos casos esto va pasar el mismo dia de la operacion. No hay restricciones para regresar al trabajo para pacientes adultos mientras no tengan doble vision.

Dr. Bartiss

Office: 910-692-2020